

CHESTIONAR DE CONCURS

24 iulie 2026 · Varianta E

Disciplina: **Algebră și Elemente de Analiză Matematică (AAM)**

DOCUMENT CONVERTIT PRIN OCR

Conținutul este cel oficial al chestionarului, transcris după o fotografie a lucrării. Acesta nu este PDF-ul oficial publicat de universitate; fotografia originală rămâne sursa de referință.

1. Să se rezolve ecuația $3^{x+1} + 3^x = 12$. (9 pct.)

a) $x = 3$

b) $x = 1$

c) $x = 2$

d) $x = -2$

e) $x = -1$

f) $x = 0$

2. Se consideră funcția bijectivă $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$. Să se calculeze (9 pct.)

$$I = \int_0^{\ln 2} f(x) dx + \int_0^{1/3} f^{-1}(x) dx,$$

unde f^{-1} este inversa funcției f .

a) $\frac{1}{3} \ln 3$

b) $\ln \frac{2}{3}$

c) $\ln \frac{3}{2}$

d) $\frac{1}{2} \ln 3$

e) $\frac{1}{3} \ln 2$

f) $\frac{1}{2} \ln 2$

3. Fie funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + x^3 + x$. Să se calculeze $f'(1)$. (9 pct.)

a) e

b) $e + 2$

c) $e + 1$

d) 0

e) $e + 4$

f) $e + 3$

4. Fie $P \in \mathbb{R}[X]$, un polinom de gradul 25, astfel încât $P(n) = \frac{1}{n+1}$, pentru orice $n \in \{0, 1, 2, \dots, 25\}$. Dacă $x_1, x_2, \dots, x_{25}$ sunt rădăcinile polinomului P , să se calculeze suma (9 pct.)

$$S = \sum_{k=1}^{25} \frac{1}{x_k}.$$

a) $\frac{26}{27}$

b) $\frac{26}{25}$

c) $\frac{25}{26}$

d) $\frac{27}{26}$

e) $\frac{24}{25}$

f) $\frac{25}{24}$

5. Se consideră ecuația $x^2 - 5x + 6 = 0$, cu soluțiile x_1 și x_2 . Să se calculeze suma $S = x_1^2 + x_2^2$. **(9 pct.)**

a) $S = -37$ b) $S = 25$ c) $S = 37$
d) $S = 5$ e) $S = 13$ f) $S = 11$

6. Fie matricea $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Să se calculeze determinantul matricei A^2 . **(9 pct.)**

a) 1 b) 4 c) -1
d) 0 e) 2 f) -2

7. Să se calculeze limita $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$. **(9 pct.)**

a) $+\infty$ b) 0 c) -1
d) 1 e) $\frac{1}{2}$ f) -3

8. Fie sistemul **(9 pct.)**

$$\begin{cases} -x + y + z = 0 \\ mx + 2y + (m + 4)z = 0 \\ -2x + 3y + (m - 2)z = 3 \end{cases}$$

Să se determine mulțimea valorilor parametrului real m pentru care sistemul are soluția unică (x_0, y_0, z_0) , care satisface condiția $x_0^{26} + y_0^{26} + z_0^{26} = 2^{26} + 2$.

a) $m \in \{3, 9\}$ b) $m \in \{9, 11\}$ c) $m \in \{1, 4\}$
d) $m \in \{3, 6\}$ e) $m \in \{3, 4\}$ f) $m \in \{6, 9\}$

9. Să se determine mulțimea soluțiilor inecuației $\sqrt{-x^2 + 8x - 15} < x - 3$. **(9 pct.)**

a) $(5, \infty]$ b) $\emptyset$ c) $\mathbb{R}$
d) $[3, 4]$ e) $(4, 5]$ f) $(-\infty, 3]$

10. Pe mulțimea $M = (4, \infty)$ se consideră legea de compoziție $x * y = xy - 4(x + y) + 20$, oricare ar fi $x, y \in M$. Dacă e este elementul neutru în raport cu legea „*”, să se calculeze $S = 2e + 1$. **(9 pct.)**

a) $S = 12$ b) $S = 11$ c) $S = 10$
d) $S = 13$ e) $S = 15$ f) $S = 19$